

巴南区举办乌皮樱桃种植开春第一课

本报记者 胡倩

为充分发挥科技在促进农业增产、农民增收方面的支撑作用,提高农户种植技术水平,助力乡村振兴,2月23日,由巴南区农技协联合会、巴南区农会、鱼洞街道百胜村村委会联合举办的2022年巴南区乌皮樱桃种植开春第一课现场培训会在巴南区鱼洞街道百胜村乌皮樱桃基地举办,农业专家们为周边的樱桃种植户在家门口送上了一场实用的技术大餐。巴南区农技协联合会、区气象局、区农产品质量安全中心、区农会负责人及樱桃种植大户等40余人参加此次培训会。巴南区农技协联合会副会长刘德洪主持此次培训会。

培训会上,巴南区气象局专家讲解了樱桃的开花、结果以及采摘与当地的温度、日照和降水都有很大关系,对此,巴南区气象局专门在百胜村建立了一个气象观测站以服务乌皮樱桃产业发展。巴南区农产品质量安全中心的专家向培训学员们宣读了巴南区食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动等资料,指导大家做好农产品质量安全保障工作。百胜村从涪陵引进的农业经理人从利用好乌皮樱桃是国家地理标志产品到延伸产品附加值等方面宣讲了果品销售技巧与策略。为保障春耕生产,此次培训会还免费向参训学员发放技术资料、修剪工具,提供了200桶涂白剂、5000张蓝色粘虫板等农资商品。

据百胜村党支部书记杨正明介绍,百胜村深入推进“资源变资产、资金变股金、农民变股民”的“三变”改革发展模式,目前村里种植的3000亩乌皮樱桃的品质有待提升,所以专门引进了一个专家团队,建立了一个200亩科技示范园,利用科研成果来促进示范园提档升级,农户以土地入股的形式,盘活村级集体资源,助推产业升级,壮大集体经济,促进地方经济发



专家演示果树嫁接的方式。 本报记者 胡倩 摄

展和群众增收。

在随后的田间培训中,专家们分别就果树的施肥、嫁接、病虫害防治等方面给果农们做了详细的介绍和指导。

为了提升乌皮樱桃的品质,百胜村种植的乌皮樱桃从开花到摘果期间都不用农药,但同时果树就可能出现果蝇等病虫害。重庆市农技总站研究员杨灿芳向果农们详细介绍了果树涂白、树枝挂蓝色粘虫板、诱虫灯(剂)等物理防治病虫害的方法。

“嫁接时一定要用薄膜把整个树枝封住……”“主要是为了防止水分流失。”高级农艺师唐元华在与果农们交流技术过程中,详细介绍了乌皮樱桃春管的技术要点,他还在果树嫁接的具体时间段、嫁接



培训会现场。 通讯员 郑华权 摄

方式、嫁接注意事项等方面进行了系统的讲解和操作示范。

“开春第一课到现在已经开展了十几年了,通过这些年的培训和村里引进的专家团队日常的指导,我们的种植技术越来越高了,(乌皮)樱桃的品质也提升了很多,价格从最初的一二十元一斤卖到了现在的四五十元一斤。”果农们纷纷高兴地说。

下一步,巴南区将紧扣农业农村高质量发展目标,积极推广“科技小院”“专家大院”“院(校)地共建”等创新服务模式,从加强技术指导培训、加强示范带动推广、加强农技人才力量三个方面扎实开展科技助力乡村振兴行动,助力巴南农业增产、农民增收和农村发展。



近日,铜梁区虎峰镇回龙村400多亩的柑橘园迎来了丰收。据了解,该园种植有大雅柑、春见、沃柑等品种,今年是挂果首年,在年前就有不少市民前来订购,春节期间也有不少游客前来采摘。

自从乡村振兴工作开展以来,虎峰镇回龙村大力发展集体经济,村民以土地入股方式,实现就近就业增收。

通讯员 李拉拉 摄

南川区科协开展收青菜头志愿服务

本报讯(通讯员 严琰)2月22日,正值青菜头丰收,南川区科协组织志愿者深入冷水关镇高峰村开展了帮助村民收获青菜头志愿服务活动。

活动中,由区科协、区农技协、专业合作大户等单位的农业专家组成的志愿者团队深入田间,帮助农民收获青菜头。同时,专家志愿者们仔细调研了今年青菜头的长势,根据农户提出的青菜头种植技术性问题进行了回答和指导。

冷水关镇高峰村村民表示,高峰村的青菜头种植,多亏了科协的专家和本地的农业专业合作

社。专业合作社免费给农户提供种子,统一品种、防虫、施肥等,区科协组织村民开展技术培训,保证了青菜头的产量和质量,提高了大家种植青菜头的积极性。

据了解,冷水关镇成立了榨菜初加工专业合作社,与涪陵榨菜集团股份有限公司合作,采取“专业合作社+公司+农户”的方式,带动全镇600多户村民种植青菜头,种植面积一共1500亩。投资建成了初加工腌渍池,形成了种植、加工、销售为一体的榨菜产业链。



樱桃的春管技术有哪些

在重庆地区,樱桃一般在2月中下旬开花,4月中旬果实成熟,从开花到果实成熟需50天左右。因此,樱桃素有“早春第一果”之称。如何使樱桃优质丰产呢?其管理技术要点如下:

1. 清园消毒。用石硫合剂沉渣,加入石灰浆刷白树干。刷白前,需用钢质柴刀或竹块刨除主杆、主枝上的翘皮、苔藓和油渍斑,这样可有效防治越冬病虫害。

2. 早施速效春肥。2月中下旬,樱桃开花前施入速效春肥。在树冠滴水处,挖1-2个环状施肥窝(坑),针对成年结果树,用沤制腐熟的油饼(枯)肥2-3公斤,加入氮磷钾复合肥1-1.5公斤混合施入;幼龄结果树,减量施肥。施肥后及时回土盖窝(坑),提高肥效。

3. 绿色防控病虫害。在樱桃的花蕾期和花谢90%时,用1000-1200倍液的托布津或1000倍液的速克灵等杀菌剂,加入1500倍液的敌杀死(或溴氰菊酯)、吡虫啉等杀虫剂,再加入0.1%硼肥、0.2%磷酸二氢钾、0.3%尿素和芸薹素等营养液混合而成的药液在树冠各喷一次,可有效防治樱桃褐腐病和卷叶蛾、蚜虫等病虫害,提高开花质量,保花稳果,培育大果。

4. 搭建避雨设施。樱桃果实一般在4月中旬的雨季成熟,其果实遇雨后极易裂口烂果,导致减产减收。因此,在樱桃果实成熟前,采用单株打伞、果林搭棚和安装钢架塑料大棚等方式,为樱桃果实避雨,可减少裂口烂果造成的损失。(高级农艺师 唐元华)

